

Azitromicina



Marca comercial: Zithromax

Clase de medicamento: Infecciones oportunistas y otros

La azitromicina, conocida también como Zithromax, pertenece a la clase de medicamentos llamados antibacterianos o antibióticos. Estos productos eliminan las bacterias (microorganismos causantes de infección en el ser humano) o impiden su multiplicación.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

Los pacientes inmunodeficientes, incluso las personas infectadas por el VIH, suelen tener infecciones bacterianas más frecuentes y graves. La azitromicina fue autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) el 14 de junio de 1996 para muchos usos, incluso para la prevención y el tratamiento de las infecciones causadas por el complejo de *Mycobacterium avium* (MAC), en personas en etapa avanzada de la infección por el VIH. También se investiga para determinar hasta qué punto previene otras clases de infecciones bacterianas en pacientes VIH-positivos.

Presentación/Administración

La azitromicina se fabrica en cápsulas, suspensión oral y tabletas para tomarse por vía oral. También se fabrica en solución líquida para administrarse por vía intravenosa. Las cápsulas y suspensión oral deben tomarse por lo menos 1 hora antes o 2 horas después de comer. Las tabletas pueden tomarse con comida.

Contraindicaciones

Las personas con enfermedad del hígado o de los riñones deben informarle al médico antes de tomar este medicamento. Este medicamento podría no ser apropiado para los pacientes con neumonía.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, la azitromicina puede causar algunos efectos adversos graves. Es preciso suspenderla y avisarle al médico de inmediato si un paciente presenta cualquiera de los síntomas siguientes después de recibir una inyección intravenosa de azitromicina: dolor, enrojecimiento e inflamación del sitio de la inyección.

En casos raros, la azitromicina ha causado

reacciones adversas graves. Los pacientes deben suspenderla y avisarle al médico de inmediato si tienen cualquiera de los siguientes síntomas de una reacción grave: dolor abdominal, diarrea (intensa, acuosa o sanguinolenta), fiebre, dolor de las articulaciones, cólico intenso o dolor de estómago intenso, erupción cutánea, inflamación de la cara, la boca, el cuello, las manos y los pies o dificultad respiratoria.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre los efectos secundarios menos graves están: diarrea leve, náusea, dolor de estómago y vómito. Las personas deben informarle al médico si estos efectos secundarios continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisarle al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas), especialmente si se trata de antiácidos que contienen aluminio o magnesio.

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian AZITROMICINA, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba AZITROMICINA. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de clinicaltrials.gov en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Azitromicina AND HIV infections.

Azitromicina



Fabricantes

Azithromycin
Pfizer Inc
235 East 42nd Street
New York, NY 10017-5755
(800) 438-1985

Zithromax
Pfizer Inc
235 East 42nd Street
New York, NY 10017-5755
(800) 438-1985

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este