

Sulfato de indinavir



Marca comercial: Crixivan

Clase de medicamento: Inhibidor de la proteasa

El sulfato de indinavir, conocido también como Crixivan, es un tipo de medicamento llamado inhibidor de la proteasa (PI, por sus siglas en inglés). Los PI obran mediante bloqueo de la proteasa, una proteína que necesita el VIH para multiplicarse.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El 13 de marzo de 1996, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el indinavir para uso con otros antirretrovirales para el tratamiento de la infección por el VIH en adultos. Este medicamento no cura ni previene la infección por el VIH o el SIDA ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

Presentación/Administración

El indinavir viene en cápsulas. Debe tomarse con el estómago vacío 1 hora antes ó 2 horas después de las comidas. Además, es importante tomar bastante líquido (por lo menos 1,5 litros diarios) durante el tratamiento con indinavir. Se debe evitar tomarlo 1 hora antes o después de tomar didanosina (Videx o ddI), otro antirretroviral.

Dosis diaria recomendada

Se recomienda una dosis diaria de 800 mg (dos cápsulas de 400 mg) cada 8 horas. Los pacientes con enfermedad hepática tal vez tengan que reducir la dosis a 600 mg cada 8 horas. La dosis de indinavir también debe ser ajustada cuando los pacientes lo toman junto con delavirdina, didanosina, efavirenz, itraconazol, ketoconazol o rifabutina. Es preciso que los pacientes tomen el indinavir tal como se lo prescribe el médico.

Contraindicaciones

Las personas con cualquier enfermedad deben informárselo al médico antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, el sulfato de indinavir puede causar algunos efectos adversos graves, incluso cálculos renales. Es preciso informarle al médico si una persona (en particular,

un niño) que tome este medicamento presenta síntomas de cálculos renales, que comprenden de dolor intenso del costado o de espalda o sangre en la orina. Para disminuir la posibilidad de cálculos renales, es importante tomar por lo menos 1,5 litros de agua diarios durante el tratamiento con indinavir. Otros efectos secundarios graves incluyen los cambios en la acumulación de grasa en el organismo, episodios más frecuentes de hemorragia en pacientes con hemofilia, alta concentración de azúcar y grasa en la sangre y comienzo o empeoramiento de diabetes. Se debe notificar al médico si tiene cualquiera de estos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo del medicamento. Entre los efectos secundarios leves de este medicamento están: alteración del sentido del gusto, diarrea, náusea o vómito, mareo o somnolencia, sensación general de debilidad, dolor de cabeza, dolor de estómago y dificultad para dormir. Se debe avisar al médico si estos efectos secundarios continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisarle al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian SULFATO DE INDINAVIR, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba SULFATO DE INDINAVIR. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de clinicaltrials.gov en <http://www.clinicaltrials.gov>

Sulfato de indinavir



Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento (cont.)

para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Sulfato de indinavir AND HIV infections.

Fabricantes

Indinavir

Merck & Company, Inc
One Merck Dr
P.O. Box 100
Whitehouse Station, NJ 08889-0100
(800) 609-4618

Crixivan

Merck & Company, Inc
One Merck Dr
P.O. Box 100
Whitehouse Station, NJ 08889-0100
(800) 609-4618

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este