

# Ribavirina



**Marca comercial:** Virazole, Rebetol, Copegus

**Clase de medicamento:** Infecciones oportunistas y otros

La ribavirina, conocida también como Copegus, Rebetol, Virazole o ingrediente de Rebetron, es una clase de antirretroviral llamado análogo de los nucleósidos. Este medicamento bloquea la capacidad que tiene el virus de la hepatitis C (VHC) para multiplicarse. La ribavirina carece de actividad contra el VIH.

## Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

La ribavirina se usa junto con interferón alfa-2a o 2b, o también con interferón pegilado alfa-2a o 2b, para tratar a los pacientes infectados por el VIH y el VHC al mismo tiempo. (Para más información ver las hojas de datos individuales para interferón alfa-2 y interferón pegilado alfa-2.)

## Presentación/Administración

Se fabrica en cápsulas y tabletas de administración oral. En los hospitales se usa una solución inhalable para los niños con infección vírica pulmonar potencialmente mortal.

## Contraindicaciones

Los pacientes con cualquier afección en curso deben informárselo al médico antes de tomar este medicamento. Las mujeres embarazadas y sus parejas sexuales no deben tomarlo.

## Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, la ribavirina puede causar algunos efectos adversos. Aunque no se conocen todos sus efectos secundarios, la ribavirina puede causar anemia (reducción del número de glóbulos rojos). La anemia puede ser peligrosa para los pacientes con problemas cardíacos o dificultad respiratoria y empeorar las enfermedades cardíacas o circulatorias. Avísele al médico si tiene dolor en el pecho o dificultad respiratoria. Entre otros efectos de la ribavirina cabe citar cansancio o debilidad poco comunes, dolor de cabeza, dificultad para dormir, inapetencia y náusea. Los pacientes deben informarle al médico si tienen cualquiera de estos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre los efectos secundarios con el uso de ribavirina inhalada están irritación de la piel debido al contacto prolongado con el medicamento

y erupción cutánea. Los trabajadores de salud que ayudan a administrar las dosis inhaladas a veces pueden sufrir dolor de cabeza, prurito e irritación o inflamación de los ojos. Los pacientes deben informarle al médico si estos efectos secundarios continúan o son molestos.

## Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

## Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian RIBARIVINA, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba RIBARIVINA. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de clinicaltrials.gov en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Ribavirina AND HIV infections.

## Fabricantes

Ribavirin  
Valeant Pharmaceuticals International  
Valeant Plaza  
3300 Hyland Avenue  
Costa Mesa, CA 92626  
(800) 548-5100

# ***Ribarivina***



## **Fabricantes (cont.)**

---

### Virazole

Valeant Pharmaceuticals International  
Valeant Plaza  
3300 Hyland Avenue  
Costa Mesa, CA 92626  
(800) 548-5100

### Rebetol

Schering - Plough Corp  
2000 Galloping Hill Rd  
Kenilworth, NJ 07033-0530  
(800) 526-4099

### Copegus

Roche Laboratories  
340 Kingsland Street  
Nutley, NJ 07110  
(973) 235-5000

## **Para más información**

---

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: [http://aidsinfo.nih.gov/live\\_help](http://aidsinfo.nih.gov/live_help)  
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este