

Aciclovir



Marca comercial: Zovirax

Clase de medicamento: Infecciones oportunistas y otros

El aciclovir, conocido también como Zovirax, es un tipo de medicamento llamado antivírico. Estos productos destruyen los virus o les impiden multiplicarse. El aciclovir se usa para tratar las infecciones por el virus del herpes que se propagan por contacto directo con la piel de otra persona. El aciclovir no cura las infecciones por herpes, pero puede ayudar a controlarlas.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El aciclovir fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos el 10 de diciembre de 1997 para uso en el tratamiento de infecciones por herpes simple que causan ampollas del resfrío y herpes genital, así como las infecciones por herpes zóster producidas por el virus causante de la varicela. Este medicamento no cura ni previene la infección por el virus del herpes o por el VIH, ni reduce el riesgo de transmisión de esos virus a otras personas.

Presentación/Administración

El aciclovir se fabrica en cápsulas, tabletas o suspensión para administración oral.

El aciclovir también viene en forma líquida para administrar por infusión intravenosa y en crema tópica para aplicar en la superficie de la piel.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informarle al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, el aciclovir puede causar algunos efectos adversos. Entre los efectos secundarios graves de este medicamento están: inflamación o enrojecimiento del sitio de inyección (intravenosa) y síntomas de insuficiencia renal aguda, tales como dolor de estómago, disminución de la cantidad de orina, sed acrecentada, cansancio inusual y debilidad. Otros efectos secundarios graves incluyen confusión, convulsiones, temblor, moretones o hemorragia inusual, escalofríos y fiebre. Los pacientes deben informarle al médico si tienen cualquiera de estos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y

disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre ellos están: náusea o vómito; sensación general de malestar, diarrea, dolor de cabeza y mareo. Los pacientes deben informarle al médico si estos efectos secundarios continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisarle al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian ACICLOVIR, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba ACICLOVIR. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de clinicaltrials.gov en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Aciclovir AND HIV infections.

Fabricantes

Acyclovir
Alpharma, Inc.
One Executive Drive
Fort Lee, NJ 07024
(201) 947-7774

Aciclovir



Fabricantes (cont.)

Acyclovir
Mylan Laboratories Inc
1030 Century Building / 130 Seventh St
Pittsburgh, PA 15222
(800) 796-9526

Zovirax
GlaxoSmithKline
5 Moore Drive
Research Triangle Park, NC 27709
(888) 825-5249

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este