

Etopósido



Marca comercial: VePesid, Toposar, Etopophos

Clase de medicamento: Infecciones oportunistas y otros

El etopósido, conocido también como VePesid, Etopophos y Toposar, pertenece a la clase de medicamentos conocidos como antineoplásicos. Estos productos desaceleran la propagación de las células cancerosas.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El etopósido se estudia en ensayos clínicos del VIH/SIDA para determinar su inocuidad y eficacia para tratar el linfoma no Hodgkin relacionado con el SIDA, un tipo de cáncer que ocurre con frecuencia en pacientes con SIDA. También se usa para tratar el sarcoma de Kaposi en pacientes con SIDA. No cura o previene la infección por el VIH ni el SIDA, ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

El etopósido está autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para el tratamiento del cáncer de los testículos y de un tipo particular de cáncer de pulmón llamado carcinoma pulmonar microcítico (es decir, de células pequeñas). También se emplea para tratar otras clases de cáncer.

Presentación/Administración

Se fabrica en cápsulas de gelatina blanda para administración oral y en forma líquida administrada por medio de inyección intravenosa.

Contraindicaciones

Es preciso informarle al médico sobre cualquier otro problema de salud que tenga el paciente antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Junto con sus efectos deseables, el etopósido puede causar efectos secundarios graves. Entre los síntomas de esos efectos están: deposiciones negras y con apariencia de alquitrán, sangre en la orina o la materia fecal, escalofrío o fiebre, tos o ronquera, lumbago o dolor lateral de la espalda, dolor o dificultad para orinar, erupción cutánea caracterizada por pequeños puntos rojos y hemorragia o hematoma y cansancio o debilidad poco comunes. Es preciso informarle al médico si el paciente tiene síntomas de cualquiera de estos efectos secundarios.

En casos raros, el etopósido puede causar reacciones alérgicas graves y, a veces, mortales. Es preciso avisarle al médico de inmediato si un paciente tratado con etopósido tiene alguno de los siguientes síntomas de reacción alérgica grave: escalofríos, mareos, frecuencia cardíaca acelerada o irregular, fiebre, sudor profuso, prurito, vahído o desmayo, náusea, inflamación de la cara, dificultad respiratoria o vómito. En ocasiones raras, han ocurrido reacciones alérgicas graves durante el primer tratamiento de un paciente con etopósido intravenoso con síntomas de lumbago, desmayo, inflamación de la cara y la lengua y estrechez o espasmos en la garganta.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre esos efectos están: alteración del gusto, escalofríos y fiebre, estreñimiento, diarrea, mareo, malestar o cansancio general, pérdida (reversible) del cabello, inflamación de las venas, falta de apetito, aftas, náusea y vómito, erupción o picazón de la piel y dolor de estómago. Un reducido número de pacientes infectados por el VIH tratados con etopósido ha notificado brotes localizados de infección por herpes zóster. Se debe informar al médico si esos efectos secundarios continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian ETOPOSÍDO, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba ETOPOSÍDO. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más

Etopósido



Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento (cont.)

completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de [clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Etopósido AND HIV infections.

Fabricantes

Etoposide

Bristol - Myers Squibb Co
PO Box 4500
Princeton, NJ 08543-4500
(800) 321-1335

VePesid

Bristol - Myers Squibb Co
PO Box 4500
Princeton, NJ 08543-4500
(800) 321-1335

Toposar

Pfizer Inc
235 East 42nd Street
New York, NY 10017-5755
(800) 438-1985

Etopophos (phosphate salt)

Bristol - Myers Squibb Co
PO Box 4500
Princeton, NJ 08543-4500
(800) 321-1335

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este