

Acetato de megestrol



Marca comercial: Megace

El acetato de megestrol, conocido también como Megace, es un tipo de medicamento llamado anticaquético. Estos productos hacen engordar al paciente.

Formas de empleo

El acetato de megestrol fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el 10 de septiembre de 1993 para tratar el adelgazamiento excesivo causado por el SIDA. No cura la infección por el VIH ni el SIDA ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

Presentación/Administración

Se fabrica en tabletas y en líquido. Puede tomarse con comida o solo.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, el acetato de megestrol puede causar algunos efectos adversos. Entre sus efectos adversos graves están hipertensión arterial, diabetes, inflamación de los vasos sanguíneos, insuficiencia cardíaca congestiva, convulsiones y neumonía. Los pacientes deben indicarle al médico si tienen síntomas de cualquiera de esos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre los efectos secundarios menos graves están diarrea, flatulencia, náusea, vómito, estreñimiento, pirosis, sequedad de la boca, aumento de la salivación y candidiasis bucal, impotencia, reducción del deseo sexual, frecuencia urinaria, incontinencia urinaria, infección de las vías urinarias, sangrado (incluso intermenstrual) y flujo vaginal, enfermedad del músculo cardíaco, palpitaciones, dolor y opresión en el pecho, edema, dificultad respiratoria, tos, dolor de garganta, afecciones pulmonares, respiración acelerada, insomnio, dolor de cabeza, debilidad, adormecimiento de alguna parte del cuerpo,

confusión, convulsiones, depresión y alteración de la capacidad de raciocinio. Se debe informar al médico si esos efectos secundarios continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos

Para información sobre ensayos clínicos que tiene que ver con Acetato de megestrol, visite el sitio Web de ClinicalTrials.gov en: <http://www.clinicaltrials.gov>. En la casilla de búsqueda, escriba: Acetato de megestrol AND HIV Infections.

Fabricantes

Megestrol acetate
Bristol - Myers Squibb Co
PO Box 4500
Princeton, NJ 08543-4500
(800) 321-1335

Megace
Bristol - Myers Squibb Co
PO Box 4500
Princeton, NJ 08543-4500
(800) 321-1335

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m.,

Acetato de megestrol



Para más información (cont.)

hora del este